



**PARC CANIN**

**La Niche**

**AMUSEMENT ET AGILITÉ**

## Prévention des blessures

### À partir de quel âge un chien peut-il pratiquer l'agilité?

En général, il est suggéré d'attendre que le chien ait terminé sa croissance, soit à l'âge de 10 mois pour les petites et moyennes races et à l'âge de 18 mois pour les grandes races.

- Pour les jeunes chiens, il est préférable de ne pas pratiquer le saut en hauteur et le slalom et de ne pas utiliser des obstacles de contact tels que la balançoire, la palissade et le pont. Toutefois, si vous voulez l'initier, vous pouvez pratiquer les obstacles au minimum.
- À partir de 4 mois, vous pouvez pratiquer plusieurs jeux au sol avec votre chiot au parc d'initiation à l'agilité canine. En effet, il s'agit d'un excellent endroit pour effectuer des exercices de fondation (focus, autocontrôle, engagement) ainsi que des exercices de rappel et d'apprentissage des commandes de base (assis, couché, debout, reste). D'ailleurs, ceux-ci permettront à votre animal d'acquérir durant sa croissance une solide base d'entraînement avant l'usage des équipements d'agilité. Si vous le souhaitez, amusez-vous à introduire le passage du tunnel à l'aide de la motivation (gâterie ou jouet). Informez-vous auprès de votre éducateur canin!

### Lors des pratiques par temps chaud, attention aux coups de chaleur!

- Privilégiez les pratiques le matin ou le soir.
- Pensez à réduire l'intensité des exercices.
- Réduisez la durée des pratiques.
- Offrez régulièrement des petites quantités d'eau à votre animal.

### Soyez vigilant avec les chiens en surpoids ou plus âgés

Adaptez le parcours en conséquence; votre chien peut être essoufflé à force de courir et peut également ressentir des douleurs aux articulations en effectuant des sauts.

### Connaissez-vous les signaux d'apaisement chez le chien?

Savez-vous comment reconnaître que votre chien communique pour dire qu'il n'est pas confortable ou que la situation est stressante pour lui?

En voici quelques-uns :

- Oreilles pointées en arrière et les yeux plissés
- Bâillements répétitifs
- Hypersalivation
- Halètement excessif sans raison
- Queue rabattue ou entre les pattes et tête basse
- Léchage de truffe
- Évite le contact visuel et cherche à se détourner
- Tremblements soudains
- Regarde dans plusieurs directions en état d'alerte

**Tenir à jour les vaccins et les traitements antiparasitaires est important pour garder votre chien en bonne santé.**